Федеральное государственное учреждение
«Российский Ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
Федерального агентства по
высокотехнологичной медицинской помощи»
(ФГУ «РНИИТО имени Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»)
195427, Санкт-Петербург, ул. Акад. Байкова, 8

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ им. Р.Р. Вредена.
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (№3)
(Ул. Акад. Байкова дом. 8, тел. 550-95-10)

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ № 5968

БУШОВА Вера Георгиевна, 55 лет

находилась на стационарном лечении с 24.04. по 30.04.2008 г.

ДИАГНОЗ: Болевой посталаминэктомический синдром. Состояние после двухсторонней установки нейростимуляторов на среднегрудном уровне.

ЖАЛОБЫ на боли в области стояния стимуляторов, боли в пояснице в области постоперационного рубца – месте проведения эпидуральных электродов. Также, как и раньше, жалуется на сильные боли в нижних конечностях, опоясывающие боли в подвздошные области, болезненную спастичность в нижних конечностях.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: весной 2006 г. стали беспокоить боли в спине, лечилась в неврологическом отделении с диагнозом – «остеохондроз». 10.06.06. развилась резкая слабость в нижних конечностях. Была сразу же госпитализирована в нейрохирургический стационар. В течение трех суток слабость в ногах прогрессировала. Была оперирована поповоду секвестрированной грыжи диска Д9\Д10, была выполнена ляминэктомия, декомпрессия спинногомозга. В течение полугода находилась в различных реабилитационных и неврологических стационарах. С января 2007 г. стала отмечать появление болей жгучего характера в ногах, затем присоединилась спастика в нижних конечностях. Боли и спастичность провоцируются вертикализацией, минимальной физической нагрузкой. Интенсивность и продолжительность болей прогрессировала. В сентябре 2007 г. была прооперирована, были установлены два нейростимулятора Itrel III и эпидуральные электроды. В послеоперационном периоде – эффекта от стимуляции не было. При осмотре в октябре и ноябре 2007 г. – боли корешкового характера в зоне LIV справа, боли в зоне корешков ThXI – LII. Локальные боли в области «нижней» поясничной раны (при пальпации в средней трети ее возникают «прострелы» в правой ноге). Также беспокоят боли в области расположения генераторов. Левый генератор активируется, но стимуляции не происходит. Измерение импеданса > 4000. Рг – графия смещения и явного обрыва электродов нет. По всей видимости, имело место размыкание цепи в области соединения электрода и удлинителя. Учитывая вышеуказанные причины, планировалось провести ревизионное вмешательство, в результате которого планировалось перемещение генераторов в во фланковые и подвздошные области, ревизия места соединения электрода и удлинителя. В последующем было принято решение полностью демонтировать противоболевую нейростимуляционную систему. В настоящее время поступила для удаления электродов, коннекторов и стимуляторов.

ЭПИД. АНАМНЕЗ: ТВС, вен. заболевания, гепатит отрицает.

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ: аллергических реакций на препараты не отмечает.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ: дважды оперирована по поводу варикозной болезни (левая нога). В 1999 г. – экстирпация матки по поводу эндометриоза. Дважды – сотрясения головного мозга. Гемотрансфузии не проводились.