

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)

Метод: Микроскопия.

Локус	Уретра
Эпителий плоский (в п/зрения)	10-15
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	-
Эпителий переходный (в п/зрения)	-
Лейкоциты (в п/зрения)	0 - 1
Эритроциты	-
Грам(+) кокки	0-1
Грам(−) кокки	-
Грам(+/-) коккобациллярная флора	-
Грам(+) палочки	0-1
Грам(−) палочки	-
Грам(+) диплококки	-
Грам(−) диплококки	-
Leptothrix	-
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	-
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	-
Трихомонады	-
Слизь	3

Комментарий: Интерпретация: « - » - не обнаружено; «0-1» - единичные в п/зрения; «1» - небольшое количество; «2» - умеренное количество; «3» - большое количество; «4» - покрывают поля зрения.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

**Нажмите на название любого показателя и узнайте, что он значит и почему может меняться (все ссылки ведут на Базу знаний Хеликс на сайте helix.ru)